

Flåtbid! Hva' så?

Mange oplever at blive bidt af en flåt. Opdager du en flåt på din eller dit barns krop, skal du fjerne den med det samme.

- Du kan fjerne flåten på flere måder - fx med pincet eller flåttang. Det er vigtigt, at du fjerner hele bagkroppen. Det gør ikke noget, hvis der sidder noget af flåtens hoved eller kæber tilbage.
- En flåt kan overføre borreliabakterier, hvis den har siddet på huden i mere end 24 timer. Det sker dog sjældent.
- Har du fjernet en flåt, så hold øje med følgende symptomer de næste 14 dage:
 1. Udslæt der vokser og ligner en ring i vandet.
 2. Uforklaret feber.
 3. Ledsmarter og hovedpine.

Har du nogle af disse symptomer, så kontakt din læge. Det kan nemlig betyde, at du er smittet med borrelia, og det skal behandles med antibiotika.

Husk: Flåtbid er som regel helt ufarlige

Flåtbid! Hva' så?

Mange oplever at blive bidt af en flåt. Opdager du en flåt på din eller dit barns krop, skal du fjerne den med det samme.

Du kan fjerne flåten på flere måder.

Det er vigtigt, at du fjerner hele bagkroppen. Det gør ikke noget, hvis der sidder noget af flåtens hoved eller kæber tilbage.

Har du fjernet en flåt, så hold øje med følgende symptomer de næste 14 dage:

1. Udslæt der vokser og ligner en ring i vandet.
2. Uforklaret feber.
3. Ledsmarter og hovedpine.

Har du nogle af disse symptomer, så kontakt din læge. Det kan nemlig betyde, at du er smittet med borrelia, og det skal behandles med antibiotika.

En flåt kan overføre borreliabakterier, hvis den har siddet på huden i mere end 24 timer. Det sker dog sjældent.

Husk: Flåtbid er som regel helt ufarlige.

midt
regionmidtjylland

Lægehuset Karup

Telefon 97 10 10 88 # www.lægehusetkarup.dk